レジメン名		Pembrolizumab+SOX													
対象がん種	胃がん	対象患者	「除不能進行・再」催吐リスク	中等度											
			1コースの日数	21日間											
			投与予定回数	PDまで											
内服抗がん剤の有無	あり		投与回数上限	なし											
※有の場合薬剤名	S-1	7													

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)												
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)									
血液毒性	好中球減少	13.0%	減量・中止を行う									
	血小板減少	14.8%	減量・中止を行う									
	貧血	5.6%	減量・中止を行う									
その他	末梢性感覚ニュー	3.7%	減量・中止を行う									

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)																				i	休薬完了
	生食	50 mL	点滴静注	30分間		•																			i	
:	キイトルーダ 生食	200 mg 50 mL	点滴静注	30分間		•																				
-;	生食	50 mL	点滴静注	30分間		•																			i	
	デキサート ホスアプレピタント 生食	9.9mg 150mg 100mL	点滴静注	30分間		•																				
	パロノセトロン 生食	0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分間		•																				
	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	130 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間		•																				
	生食	50 mL	点滴静注	30分間		•																			1	

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp 薬剤:	名	投与量	用法	 day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 S-1		80-120mg/day	内服		•	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	••	•						
2 デカド	ごロン錠	8 mg/day	内服																						