レジメン名	CBDCA+PEM+Amivantamab 1サイクル目【80kg以上】				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	3サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	3サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	23.8%	G-CSF
	貧血	25.2%	輸血
その他	発疹	64.9%	適正使用ガイドに準ずる
	爪囲炎	55.6%	適正使用ガイドに準ずる
	Infusion reaction	41.1%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●	●						●							●						
2	プロイメンド点滴静注用 生食	150mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
3	パロノセトロン塩酸塩注射剤 デキサート注射液 ファモチジン20mg ポララミン5mg 生食	0.75mg/5ml 1瓶 3.3mg/1ml 6瓶 20mg/2ml 1瓶 5mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
4	デキサート注射液 ファモチジン20mg ポララミン5mg 生食	3.3mg/1ml 3瓶 20mg/2ml 1瓶 5mg 100ml	点滴静注	30分			●						●							●						
5	ペメトレキセド点滴静注用生食	500mg/㎡ 100ml	点滴静注	10分		●																				
6	カルボプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	AUC 5 250ml	点滴静注	1時間		●																				
7	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 1瓶 243ml	点滴静注	50ml/hで開始 投与開始2時間後に 75ml/hに		●																				
8	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 4瓶 222ml	点滴静注	25ml/hで開始 投与開始2時間後に 50ml/hに			●																			
9	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 5瓶 215ml	点滴静注	65ml/h									●													
10	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 5瓶 215ml	点滴静注	85ml/h																●						
11	生食	50ml	点滴静注	15分		●	●						●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カロナール300mg	3錠	ライブリバント投与前			●	●						●							●						
2	デカドロン4mg	1錠	朝食後					●																		