レジメン名	BDCA+PEM+Amivantamab 5サイクル目以降【80kg未満				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	3サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	3サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	23.8%	G-CSF
	貧血	25.2%	輸血
その他	発疹	64.9%	適正使用ガイドに準ずる
	爪囲炎	55.6%	適正使用ガイドに準ずる
	Infusion reaction	41.1%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
2	デキサート注射液 ファモチジン20mg ポララミン5mg 生食	3.3mg/1ml 3瓶 20mg/2ml 1瓶 5mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
3	ペメトレキセド点滴静注用生食	500mg/㎡ 100ml	点滴静注	10分		●																				
4	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 5瓶 215ml	点滴静注	125ml/h		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カロナール300mg	3錠	ライブリバント投与前			●																				