レジメン名	IMF±Lyn(維持療法)				
対象がん種	子宮体がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	PDまで継続
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	リムパーザ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	38-50%	GCSF製剤投与や減量の検討。
	貧血	33-61%	輸血や減量の検討。
その他	Grade3以上irAE	4.2-6.4%	中断、集学的治療考慮。

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	30分		●																											
2	イミフィンジ 生食	1500mg 100mL	点滴静注	1時間		●																											
3	生食	50mL	点滴静注	30分		●																											

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	リムパーザ150mg	600mg	1回2錠1日2回			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●