

| レジメン名     |       | Nivo+GC |       |         |     |
|-----------|-------|---------|-------|---------|-----|
| 対象がん種     | 尿路上皮癌 | 対象患者    | 局所進行性 | 催吐リスク   | 高度  |
|           |       |         | 転移性   | 1コースの日数 | 21日 |
| 内服抗がん剤の有無 | なし    |         |       | 投与予定回数  | 6   |
| ※有の場合薬剤名  |       |         |       | 投与回数上限  | 6   |

以降はNivo単剤

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) |       |                   |
|------------------------|-------|-------------------|
| 項目                     | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など)      |
| 貧血                     | 57.2% | 減量・休薬・輸血など        |
| 嘔気                     | 46.7% | 補液・休薬など           |
| 好中球減少                  | 30.6% | 減量・休薬・輸血などG-CSFなど |
|                        |       |                   |
|                        |       |                   |

レジメン内容(支持療法を含む)

|    |                     |           |      | day   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |      |  |  |
|----|---------------------|-----------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|--|--|
| 1  | 生食                  | 50ml      | 点滴静注 | 15分   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 休薬完了 |  |  |
| 2  | オプジーボ               | 360mg     | 点滴静注 | 1時間   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 生食                  | 100ml     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 3  | 生食                  | 50ml      | 点滴静注 | 15分   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 4  | 生食                  | 1000ml    | 点滴静注 | 2時間   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 硫酸Mg補正液1mEq/ml      | 8ml       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | KCL注20mEqキット        | 20ml      |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 5  | 生食                  | 50ml      | 点滴静注 | 15分   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 6  | ホスアプレピタント点滴静注用150mg | 1B        | 点滴静注 | 30分   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 生食                  | 100ml     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 7  | パロセトン静注0.75mg/5mL   | 1B        | 点滴静注 | 30分   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | デキサート注3.3mg/ml      | 3ml       |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 生食                  | 100ml     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 8  | ゲムシタビン              | 1000mg/m2 | 点滴静注 | 30分   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 生食                  | 100ml     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 9  | シスプラチン              | 70mg/m2   | 点滴静注 | 1.5時間 | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 生食                  | 250ml     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 10 | ランックス注20mg          | 1A        | 点滴静注 | 全開    | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 生食                  | 50ml      |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 11 | 生食                  | 500ml     | 点滴静注 | 2時間   | ● |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 12 | 生食                  | 50ml      | 点滴静注 | 15分   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 13 | デキサート注3.3mg/ml      | 2ml       | 点滴静注 | 30分   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 生食                  | 100ml     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 14 | ゲムシタビン              | 1000mg/m2 | 点滴静注 | 30分   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
|    | 生食                  | 100ml     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |
| 15 | 生食                  | 50ml      | 点滴静注 | 15分   |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |  |  |

|       |         |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| デカドロン | 8mg(2錠) | 内服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

シスプラチン投与終了までに1-1.5Lの経口補液