ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長		体重		体表面積		ERSECTIONFORMALI
					測定日		測定日		測定日		医師名
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSE	@PATIENTBIRTH	NTAGEFORI	HEIGHT01_D	cm	HEIGHT01_D	kg	#VALUE!	m^2	@USERNAME
					$HEIGHT02_Doc		$WHEIGHT02_Doc		1900/1/0		

レジメン名	JALSG-PhALL219 強化地固め(60歳以上)				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	38
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名	ダサチニブ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	99.2%	GCSF投与
	血小板減少	97.8%	輸血
	貧血	98.0%	輸血
その他	敗血症	15.0%	抗菌薬
	ニューロパチー	3.6%	抗癌剤中止
	イレウス	3.6%	抗癌剤中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考（投与時刻、モニターなど）																												
1	生理食塩水	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●					●							●							●						
2	ホスアプレピタント 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	100ml/h		●																											
3	オンコビン 生理食塩水	1.3mg/㎡(最大2mg) 50ml	点滴静注	500mL/hr		●							●							●							●						
4	ダウノルビシン 生理食塩水	30mg/㎡ 100ml	点滴静注	100mL/hr		●	●	●																									
5	エンドキサン 生理食塩水	900mg/㎡ 500ml	点滴静注	200mL/hr		●																											
6	生理食塩水	50ml	点滴静注	100mL/hr		●	●	●					●							●							●						
7	メソトレキセート デキサート 注射用水	15mg/body 3.3mg/body 6ml	髄注			●																											

					day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	備考（投与時刻、モニターなど）										休薬完了
1															
2															
3															
4															
5															
6															

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロン	2mg				●	●	●																									
2	プレドニゾロン	45mg/㎡				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
3	プレドニゾロン	30mg/㎡																									●	●					
4	プレドニゾロン	15mg/㎡																											●	●			
5	プレドニゾロン	5mg/㎡																													●	●	●
6	ダサチニブ	100mg/body							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1															
2	ダサチニブ	100mg/body				●	●	●							
3															
4															
5															