レジメン名	Flu+MEL140				
対象がん種	骨髄異形成症候群	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	8日間
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	頻度不明	
その他	感染症	頻度不明	
	腎毒性	頻度不明	
	粘膜障害	頻度不明	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)								休薬完了
1	生理食塩液50ml フルダラビン前フラッシュ用	20ml	点滴静注			●	●	●	●	●			
2	フルダラ静注用50mg 生理食塩液100ml 前後で生食フラッシュ メイン止め	30mg/m2 100ml	点滴静注	30分		●	●	●	●	●			
3	生理食塩液50ml フルダラビン後フラッシュ用	20ml	点滴静注			●	●	●	●	●			
4	生理食塩液50ml ホスアプレピタント前フラッシュ用	20ml	点滴静注								●		
5	ホスアプレピタント点滴静注用 デキサート注射液 グラニセトロン静注液 生理食塩液100ml 前後生食フラッシュ メイン止め、フィルター不可	3.0mg/kg（最大150mg） 0.1mg/kg（最大4.0mg） 0.04mg/kg 100ml	点滴静注	1時間							●		
6	生理食塩液50ml ホスアプレピタント後フラッシュ用	20ml	点滴静注								●		
15	デキサート注射液 グラニセトロン静注液 生理食塩液20ml	0.1mg/kg（最大4.0mg） 0.04mg/kg 3ml	静注									●	
7	生理食塩液50ml アルケラン前フラッシュ用	20ml	点滴静注								●	●	
8	アルケラン静注用50mg 生理食塩液250ml	70mg/m2 250ml	点滴静注	1時間							●	●	
9	生理食塩液50ml アルケラン後フラッシュ用	20ml	点滴静注								●	●	

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8
1	なし												