レジメン名	ダトロウェイ					
対象がん種	乳がん	対象患者	再発	催吐リスク	中等度
			切除不能進行	1コースの日数	21
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	5.0%	G-CSF製剤の使用、減量の検討
	貧血	15.6%	輸血の検討、減量の検討
その他	悪心	55.8%	制吐薬の強化の検討
	脱毛	37.8%	
	下痢	10.6%	整腸剤、止瀉薬の検討

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	30分		●																				
2	パロノセトロン(アロキシ) デキサート ファモチジン ボララミン 生食	0.75mg 9.9mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	30分		●																				
3	5%ブドウ糖注射液	50mL	点滴静注	15分		●																				
4	ダトロウェイ 注射用水 ５％ブドウ糖注射液	6mg/kg 0.3ml/kg 100mL	点滴静注	初回90分 2回目以降は30分		●																				
5	5%ブドウ糖注射液	50mL	点滴静注	15分		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アセトアミノフェン	600mg	化学療法前			●																				