

レジメン名	ルンスミオ 1サイクル目 ステップアップ用量				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21 days
				投与予定回数	
				投与回数上限	
内服抗がん剤の有無	なし				
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	G-CSF、抗菌薬など
	貧血	輸血など
	血小板減少	輸血など
その他	サイトカイン放出症候群	トシリズマブ、ステロイドなど
	ICANS	ステロイドなど

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr	投与時刻(必要時)	●							●							●						
2	デキサメサゾン 生理食塩液	19.8mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	ルンスミオ1時間前	●							●							●						
3	ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	ルンスミオ30分前	●							●							●						
4	ルンスミオ 生理食塩水	1mg 50ml	点滴静注		4時間	●																				
5	ルンスミオ 生理食塩水	2mg 100ml	点滴静注		4時間								●													
6	ルンスミオ 生理食塩水	60mg 250ml	点滴静注		4時間															●						
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アセトアミノフェン	600-900mg	内服		ルンスミオ1時間前	●							●							●						