レジメン名	ルンスミオ　2サイクル目(2時間)				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21 days
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		G-CSF、抗菌薬など
	貧血		輸血など
	血小板減少		輸血など
その他	サイトカイン放出症候群		トシリズマブ、ステロイドなど
	ICANS		ステロイドなど

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																				
2	デキサメサゾン 生理食塩液	19.8mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	ルンスミオ1時間前	●																				
3	ポララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	ルンスミオ30分前	●																				
4	ルンスミオ 生理食塩水	60mg 250ml	点滴静注		2時間	●																				
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アセトアミノフェン	600-900mg	内服		ルンスミオ1時間前	●																				