レジメン名		ルンスミオ 再開容量												
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発	催吐リスク	最小度									
				1コースの日数	14 days									
				投与予定回数										
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限										
※有の場合薬剤名														

副作用情報(頻	度が高い、特徴的な副作	:用など)							
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)						
血液毒性	好中球減少		G-CSF、抗菌薬など						
	貧血		輸血など						
	血小板減少		輸血など						
その他	サイトカイン放出症候群		トシリズマブ、ステロイドなど						
	ICANS		ステロイドなど						

レジメン内容(支持療法を含む)

	プラド1音(文)が派出を目む																		
					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rр	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		•							•						
2	デキサメサゾン 生理食塩液	19.8mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	ルンスミオ1時間前	•							•						
3	ポララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	ルンスミオ30分前	•							•						
5	ルンスミオ 生理食塩水	2mg 100ml	点滴静注		4時間	•													
6	ルンスミオ 生理食塩水	60mg 250ml	点滴静注		4時間								•						
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		•							•						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	アセトアミノフェン	600-900mg	内服	 ルンスミオ1時間前	•							•						ł
																		l