| レジメン名 | IsaVRd療法（5-17コース目） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 多発性骨髄腫 | 対象患者 | 再発・難治 | 催吐リスク | 最小度 |
| | | | | 1コースの日数 | 28日 |
| | | | | 投与予定回数 | 13コース |
| 内服抗がん剤の有無 | あり | | | 投与回数上限 | |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
|---|---|---|---|
| 血液毒性 | 好中球減少 | 43.4% | 休薬することがある |
| | 血小板減少 | 11.2% | 同上 |
| | | | |
| その他 | 肺炎 | 15.1% | 抗菌薬など |
| | 敗血症 | 1.3% | 同上 |
| | infusion reaction | 37.5% | 中断、ヒドロコルチゾンなど |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 2 | ファモチジン<br>ボララミン<br>生理食塩液 | 20mg<br>5mg<br>50mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 4 | サークリサ<br>生理食塩液 | 10mg/kg<br>計250mLにする | 点滴静注 | 200mL/hr | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 30分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アセトアミノフェン | 900mg | サークリサ30分前 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 2 | レナデックス | 20mg | サークリサ30分前 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 3 | レナリドミド | 25mg | 1日1回 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 他、適宜抗真菌薬、ST合剤など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | | | | |
| 2 | ファモチジン<br>ボララミン<br>生理食塩液 | 20mg<br>5mg<br>50mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 15分 | | | | | | | | |
| 4 | サークリサ<br>生理食塩液 | 10mg/kg<br>計250mLにする | 点滴静注 | 200mL/hr | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 | 50mL | 点滴静注 | 30分 | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アセトアミノフェン | 900mg | サークリサ30分前 | | | | | | | | | |
| 2 | レナデックス | 20mg | サークリサ30分前 | | | ● | | | | | | |
| 3 | レナリドミド | 25mg | 1日1回 | | | | | | | | | |
| 4 | 他、適宜抗真菌薬、ST合剤など | | | | | | | | | | | |