レジメン名	CPT-11+NDP				
対象がん種	精巣腫瘍	対象患者	術前	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	制限なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	制限なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		減量・G-CSF投与
	貧血		減量・輸血
	血小板減少		減量・輸血
その他	倦怠感		休薬、支持療法
	下痢		休薬、支持療法

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	30分		●														●													
2	パロノセトロン静注0.75mg/5mL	5ml	点滴静注	30分		●														●													
	デキサート注3.3mg/ml	3ml																															
	生食	100ml																															
3	イリノテカン注	150mg/m2	点滴静注	90分		●														●													
	生食	500ml																															
4	アクプラ注	100mg/m2	点滴静注	90分		●																											
	生食	500ml																															
5	アセテート維持液3G「HK」	500ml	点滴静注	2時間		●																											
6	アセテート維持液3G「HK」	500ml	点滴静注	2時間		●																											
7	生食	50ml	点滴静注	30分																●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	デカドロン	8mg（2錠）	内服				●	●													●	●											