レジメン名	テブダック				
対象がん種	子宮頸がん	対象患者	再発・難治	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	病勢進行まで
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	8.0%	減量、延期、Gradeにより中止
		0.0%	
		0.0%	
その他	眼症状	52.8%	休薬、減量、所見とGradeにより中止
		0.0%	
		0.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
]	生食	50ml	点滴静注	30分		●																				
2	生食 デキサート	50ml 6,6mg	点滴静注	30分		●																				
3	5%ブドウ糖注射液	50ml	点滴静注	15分		●																				
4	テブダック 注射用水 5%ブドウ糖注射液	2mg/kg（最大200mg） 0.2ml/kg 100ml（最終濃度0.7～2.4mg/mlとする） ※投与量が80mg以下の場合は5%ブドウ糖注射液50mlに変更	点滴静注	30分		●																				
3	5%ブドウ糖注射液	50ml	点滴静注	30分		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	フルメトロン点眼液0.1%		1日3回投与		投与24時間前（day0） ～day3 両目に点眼	●	●	●																		
2	ブリモニジン酒石酸塩 点眼液0.1%		テフダック投与直前 1回 両目に点眼		テフダック投与直前 1回 両目に点眼	●																				
3	ヒアルロン酸Na 点眼液0.1%		1日5-6回投与		day1～投与終了後 30日目まで両目に点眼	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●