

レジメン名	テクベイリ 導入				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	13 days
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		G-CSF、抗菌薬など
	貧血		輸血など
	血小板減少		輸血など
その他	サイトカイン放出症候群		トシリズマブ、ステロイドなど
	ICANS		ステロイドなど

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)													休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●			●			●						
2	ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	テクベイリ30分前	●			●			●						
3	テクベイリ皮下注30mg	0.06mg/kg	皮下注			●												
4	テクベイリ皮下注30mg	0.3mg/kg	皮下注						●									
5	テクベイリ皮下注153mg	1.5mg/kg	皮下注									●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	アセトアミノフェン	600-900mg	内服		テクベイリ1時間前	●			●			●						
2	デカドロン錠	16mg	内服		テクベイリ1時間前	●			●			●						