レジメン名	イムデトラ（2サイクル目以降）				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	最小度
			再発	1コースの日数	14日
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	6.0%	適正使用ガイドに準ずる
	貧血	13.5%	適正使用ガイドに準ずる
		0.0%	
その他	CRS	52.6%	適正使用ガイドに準ずる
	ICANS	5.3%	適正使用ガイドに準ずる
	間質性肺疾患	0.8%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●													
2	イムデトラ 注射用水 輸液安定化液 生食	10mg 4.2ml 13ml 233ml	点滴静注	60分		●													
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	なし																		