

レジメン名	3wパクリカルボフェスゴ療法（2回目以降）				
対象がん種	乳がん	対象患者	乳癌	催吐リスク	中等度
			Stage1-3	1コースの日数	21日
			80歳未満	投与予定回数	4～9
内服抗がん剤の有無	なし		HER2陽性	投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	66.0%
	貧血	67.0%
	血小板減少	19.0%
その他	心不全	0.6%
	悪心、下痢、嘔吐	1%以上
	呼吸困難	1%以上

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50ml	点滴静注	30分				●							●													休業完了
2	フェスゴMA	10ml (ベルツズマブ600mg トラスツズマブ600mg)	皮下注	5分				●																				
3	デキサート ファモチジン ボラミン パロノセトロン アロカリス 生食	6.6mg 20mg 5mg 0.75mg 235mg 100mL	点滴静注	30分				●																				
3	デキサート ファモチジン ボラミン 生食	6.6mg 20mg 5mg 50mL	点滴静注	30分											●													
4	生食	50ml	点滴静注	30分				●							●													
5	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/m2 250ml	点滴静注	1時間				●							●													
6	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC:6 250ml	点滴静注	1時間				●																				
7	生食	50ml	点滴静注	30分				●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	1	2	3	4																			
1																												

day1のプレメディの速度：200mL/h→30分へ変更、生食は50mL→ 100mLへ変更
day8のプレメディの速度：200mL/h→30分へ変更