レジメン名	低用量リツキシマブ				
対象がん種		対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		0.0%	
		0.0%	
その他	infusion reaction	68.2%	中断、投与速度の変更、薬剤使用、
		0.0%	
		0.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●							●							●							●						
2	ポララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr		●							●							●							●						
3	リツキシマブBS 生理食塩液	100mg 90mL	点滴静注	初回は固定速度50ml/hr、2回目以降は100ml/hの固定速度		●							●							●							●						
4	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●							●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	イブプロフェン	200mg	リツキシマブ30分前			●							●							●							●						