レジメン名	Amivantamab+Lazertinib 1サイクル目【80kg以上】				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	ラズクルーズ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	低アルブミン血症	48.5%	適正使用ガイドに準ずる
	AST上昇	36.1%	適正使用ガイドに準ずる
		0.0%	
その他	発疹	61.8%	適正使用ガイドに準ずる
	爪囲炎	68.4%	適正使用ガイドに準ずる
	Infusion reaction	62.9%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●	●						●							●							●						
2	デキサート注射液 ファモチジン20mg ポララミン5mg 生食	3.3mg/1ml 3瓶 20mg/2ml 1瓶 5mg 100ml	点滴静注	30分		●	●																										
2	ファモチジン20mg ポララミン5mg 生食	20mg/2ml 1瓶 5mg 100ml	点滴静注	30分									●							●							●						
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●	●						●							●							●						
4	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 1瓶 243ml	点滴静注	50ml/hで開始 投与開始2時間後に 75ml/hに		●																											
4	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 3瓶 229ml	点滴静注	35ml/hで開始 投与開始2時間後に 50ml/hに			●																										
4	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 4瓶 222ml	点滴静注	65ml/h									●																				
4	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 4瓶 222ml	点滴静注	85ml/h																●													
4	ライブリバント点滴静注用 生食	350mg/7ml 4瓶 222ml	点滴静注	125ml/h																							●						
5	生食	50ml	点滴静注	15分		●	●						●							●							●						
6	ヘパリンNaロック用10単位/ml	10ml	静注	ショット		●																											
10																																	

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール300mg	3錠	ライブリバント投与前			●	●						●							●							●						
2	ラザクルーズ240mg	1錠	朝食後			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	エリキュース2.5mg	2錠	朝・夕食着			●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
4																																	