| レジメン名 | Amivantamab+Lazertinib 2サイクル目以降【80kg未満】 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 肺がん | 対象患者 | 切除不能進行・再発 | 催吐リスク | 最小度 |
| | | | | 1コースの日数 | 14日 |
| | | | | 投与予定回数 | |
| 内服抗がん剤の有無 | あり | | | 投与回数上限 | |
| ※有の場合薬剤名 | ラズクルーズ | | | | |

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
|---|---|---|---|
| 血液毒性 | 低アルブミン血症 | 48.5% | 適正使用ガイドに準ずる |
| | AST上昇 | 36.1% | 適正使用ガイドに準ずる |
| | | 0.0% | |
| その他 | 発疹 | 61.8% | 適正使用ガイドに準ずる |
| | 爪囲炎 | 68.4% | 適正使用ガイドに準ずる |
| | Infusion reaction | 62.9% | 適正使用ガイドに準ずる |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ファモチジン20mg<br>ボララミン5mg<br>生食 | 20mg/2ml 1瓶<br>5mg<br>100ml | 点滴静注 | 30分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ライブリバント点滴静注用<br>生食 | 350mg/7ml 3瓶<br>229ml | 点滴静注 | 125ml/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カロナール300mg | 3錠 | ライブリバント投与前 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ラズクルーズ240mg | 1錠 | 朝食後 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | エリキュース2.5mg | 2錠 | 朝・夕食着 | | | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |