レジメン名	DVRd療法(移植適応)　7コース目以降					
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	初発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	レプラミド				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	62.1%	休薬することがある
	血小板減少	29.1%	同上
その他	感染症	27.2%	抗菌薬
	末梢性ニューロパ	35.0%	休薬することがある
	輸中関連反応	42.0%	ほとんどがgrade1-2

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	ダラキューロ	15mL	皮下注	3分		●																											

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	レプラミド	10mg				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●