

ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長		体重		体表面積		SECTIONFORMAL
					測定日	cm	測定日	kg	#VALUE!	m ²	
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSEX	@PATIENTBIRTH	ENTAGEFORM	HEIGHT01_D	cm	HEIGHT01_D	kg	\$HEIGHT02_Doc	\$WHEIGHT02_Doc	1900/1/0 @USERNAME

レジメン名	Tislelizumab(食道癌)				
対象がん種	食道がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	軽度
			1コースの日数	21日	
			投与予定期回数	未定	
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限		
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
その他	AST上昇	11.4% 中止・延期、irAEも考慮
	貧血	11.0% 中止・延期、輸血など
	甲状腺機能低下症	10.2% 中止・延期、irAEも考慮
	疲労	7.5% 中止・延期、irAEも考慮
	食思不振	6.3% 中止・延期、irAEも考慮
	下痢	5.5% 中止・延期、irAEも考慮

レジメン内容(支持療法を含む)

				day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp 薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考(投与時刻、モニターなど)																				休薬完了	
1 生食	50 mL	点滴静注	30分間		●																				
2 テビムプラ 生食	200 mg 50 mL	点滴静注	初回60分、 2回目以降30分ま で短縮可		●																				
3 生食	50 mL	点滴静注	30分間		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp 薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 なし																								

Rp1とRp3の生食を100mL→50mLへ変更しました。