| レジメン名 | mini CHOP(3週毎) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 悪性リンパ腫 | 対象患者 | | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | | 1コースの日数 | 21日 |
| | | | | 投与予定回数 | 進行期：6～8コース |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与回数上限 | 8コース |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

| 副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など） | | | |
|---|---|---|---|
| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | 好中球減少 | | |
| | 貧血 | | |
| | | | |
| その他 | 悪心・嘔吐 | | |
| | 末梢神経障害 | | |
| | 脱毛 | | |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 100ml/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | オンコビン<br>生食 | 1mg<br>50ml | 点滴静注 | 500ml/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ドキソルビシン<br>生食 | 25mg/㎡<br>100ml | 点滴静注 | 200ml/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | エンドキサン<br>生食 | 400mg/㎡<br>250ml | 点滴静注 | 250ml/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 50ml | 点滴静注 | 100ml/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カイトリル | 2mg | 化学療法前 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | プレドニゾロン | 40mg/$m^2$/day | 1日2回 | | | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | | | | | | | | | | | | | | | | |