レジメン名	イピリムマブ+ニボルマブ併用療法				
対象がん種	腎癌	対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	4コース
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考（投与時刻、モニターなど）																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
2	オプジーボ 生食	240mg 100ml	点滴静注	1時間		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
4	ヤーボイ 生食	1mg/kg 30ml	点滴静注	30分		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									