ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長	体重	体表面積	医師名
					測定日	測定日	測定日	
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSE	@PATIENTBIRTH	:NTAGEFOR	HEIGHT01_D cm	WEIGHT01_ kg	#VALUE! m^2	@USERNAME
					30/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	

レジメン名	ALL-R08 R1療法（3歳以上、DEX/6-MP内服）
対象がん種	急性リンパ性白血病
内服抗がん剤の有無	あり
従来の催吐薬処方	ロイヤジン

対象患者		催吐リスク	高度
		ミニマスの日数	21日間
		悪性浮腫発現	
		悪性浮腫以上歯	

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	頻度不明	
	骨髄炎	頻度不明	
その他	腎毒性	頻度不明	
	神経毒性	頻度不明	
	肝毒性	頻度不明	

レジメン内容（支持療法を含む）

No	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与間隔・必要時	day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Day	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与間隔・必要時																					DAY1							
	生理食塩水50ml ホスアプレピタント前フラッシュ用	20ml	点滴静注			●																											
2	ホスアプレピタント点滴静注用 グラニセトロン静注液 生理食塩水100ml 5μg/kg/hにならなように生食量を調整 前後生食フラッシュ メイン止め、フィルター不可	3.0mg/kg(最大150mg) 0.04mg/kg 100ml	点滴静注	1時間		●																											
3	生理食塩水50ml ホスアプレピタント後フラッシュ用	20ml	点滴静注			●																											
4	生理食塩水50ml オンコビン前フラッシュ用	20ml	点滴静注			●					●																						
5	オンコビン注射用 生理食塩水50ml 前後で生食フラッシュ メイン止め、フィルター不可	1.5mg/m2(最大2.0mg) 20ml	点滴静注	10分		●					●																						
6	生理食塩水50ml オンコビン後フラッシュ用	20ml	点滴静注			●					●																						
7	生理食塩水50ml メソトレキセート前フラッシュ用	20ml	点滴静注			●																											
8	メソトレキセート 生理食塩水50ml 投与時メイン止め	100mg/m2 50ml	点滴静注	30分	14時	●																											
9	メソトレキセート 生理食塩水500ml 投与時メイン減量	900mg/m2 500ml	点滴静注	25.5時間	14時30分	●																											
10	ダイアモックス注500mg 生理食塩水20ml 5歳未満125mg、5歳以上250mg MTX開始12時間前	250mg 5ml	静注		2時	●																											
11	ダイアモックス注500mg 生理食塩水20ml 5歳未満125mg、5歳以上250mg MTX開始8時間前	250mg 5ml	静注		8時	●																											
12	ダイアモックス注500mg 生理食塩水20ml 5歳未満125mg、5歳以上250mg MTX開始直前	250mg 5ml	静注		14時	●																											
13	ダイアモックス注500mg 生理食塩水20ml 5歳未満125mg、5歳以上250mg MTX開始8時間後	250mg 5ml	静注		20時	●																											
14	ダイアモックス注500mg 生理食塩水20ml 5歳未満125mg、5歳以上250mg MTX開始12時間後	250mg 5ml	静注		2時		●																										
15	ダイアモックス注500mg 生理食塩水20ml 5歳未満125mg、5歳以上250mg MTX開始18時間後	250mg 5ml	静注		8時		●																										
16	ダイアモックス注500mg 生理食塩水20ml 5歳未満125mg、5歳以上250mg MTX開始24時間後	250mg 5ml	静注		14時		●																										
17	生理食塩水50ml メソトレキセート後フラッシュ用	20ml	点滴静注		2時			●																									
18	レボホリナート注25mg 生理食塩水20ml MTX開始44時間後	7.5mg/m2 5ml	静注		14時			●																									
19	レボホリナート注25mg 生理食塩水20ml MTX開始54時間後	7.5mg/m2 5ml	静注		20時			●																									
20	ペグシペルガーゼ5mg ヒロマキシン40mg ノルシニン10mg 0.5%注射用水120ml 静注2時間 【注意】 はじめのMTXの1%が終わってから投	12mg 20mg 10mg 5.8ml	筋注		14時30分	●																											
21	生理食塩水50ml シタラビン前フラッシュ用	20ml	点滴静注							●																							
22	グラニセトロン静注液 生理食塩水20ml シタラビン投与前	0.04mg/kg 3ml	静注							●																							
23	シタラビン注Ia 生理食塩水250ml 点眼あり メイン止め、フィルター通ず	2000mg/m2 250ml	点滴静注	3時間						●																							
24	生理食塩水50ml シタラビン後フラッシュ用	20ml	点滴静注							●																							
25	生理食塩水50ml シタラビン前フラッシュ用	20ml	点滴静注							●																							
26	グラニセトロン静注液 生理食塩水20ml シタラビン投与前	0.04mg/kg 3ml	静注							●																							
27	シタラビン注Ia 生理食塩水250ml 点眼あり メイン止め、フィルター通ず	2000mg/m2 250ml	点滴静注	3時間						●																							
28	生理食塩水50ml シタラビン後フラッシュ用	20ml	点滴静注							●																							
29	生理食塩水50ml オンキャスパー前フラッシュ用	20ml	点滴静注								●																						
30	オンキャスパー点滴静注用3750 エズ(注射用水)20ml 生理食塩水100ml (1万5.2unit の注射用水で溶解(750単位/mL)	1000U/m2 1.333ml/m2 100ml	点滴静注	2時間							●																						
31	生理食塩水50ml オンキャスパー後フラッシュ用	20ml	点滴静注								●																						

内服抗がん剤・支持療法薬

No	薬剤名	投与量	用法		day 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ロイケリン	100mg/m2	経口服用内服	day1~5	●	●	●	●	●																							
2	デカドロン(DEX)	20mg/m2/day	経口:92-3	day1~5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																							
	注射液へ変更時	16.5mg/m2/day	静注:92-3	day1~5	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●																							
3	デカドロン(DEX)	10mg/m2/day	経口:92-3	day6						●●●																						
	注射液へ変更時	8.25mg/m2/day	静注:92-3	day6						●●●																						