レジメン名	タービー 再開(B法 0.4mg/kg)				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	17days
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	25.0%	G-CSF、抗菌薬など
	貧血	25.0%	輸血など
	血小板減少	20.0%	輸血など
その他	サイトカイン放出症候群	76.0%	トシリズマブ、ステロイドなど
	ICANS	9.0%	ステロイドなど
	口腔毒性	82.0%	休薬または投与間隔の延長

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																	休薬完了
1	タービー皮下注40mg	0.4mg/kg	皮下注			●																
2	タービー皮下注40mg	0.8mg/kg	皮下注						●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	アセトアミノフェン	600-900mg	内服		タービー1時間前	●			●													
2	デカドロン	16mg	内服		タービー1時間前	●			●													
3	ポララミン	2mg	内服		タービー1時間前	●			●													