レジメン名	ALL-T19 HR群 強化療法 (HR2相, CNS1, アーウィナーゼ, 25-39歳)				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	1〜2
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	2
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●				
2	ホスアプレピタント 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h	12時30分	●																			
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	100mL/h	13時	●																			
4	フィルデシン 生理食塩液	3mg/m2 (max 5mg) 50mL	点滴静注	500m/h	13時30分	●					●														
5	メソトレキセート 生理食塩液	500mg/m2 100mL	点滴静注	30分	14時	●																			
6	メソトレキセート 生理食塩液	2500mg/m2 500mL	点滴静注	23時間30分	14時30分	●																			
7	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		2時	●	●																		
8	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		8時	●	●																		
9	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	静注		14時	●	●																		
10	ダイアモックス 生理食塩液	250mg 10mL	点滴静注		20時	●																			
11	ロイコボリン 生理食塩水	15mg/m2 20ml	静注		2時				●																
12	ロイコボリン 生理食塩水	15mg/m2 20ml	静注		8時			●	●																
13	ロイコボリン 生理食塩水	15mg/m2 20ml	静注		14時			●																	
14	ロイコボリン 生理食塩水	15mg/m2 20ml	静注		20時			●																	
15	イホマイド 生理食塩液	800mg/m2 250mL	点滴静注	250mL/h	10時			●	●																
16	イホマイド 生理食塩液	800mg/m2 250mL	点滴静注	250mL/h	22時		●	●	●																
17	ウロミテキサン 生理食塩液	160mg/m2 20mL	静注		3時			●	●	●															
18	ウロミテキサン 生理食塩液	160mg/m2 20mL	静注		7時			●	●	●															
19	ウロミテキサン 生理食塩液	160mg/m2 20mL	静注		11時			●	●																
20	ウロミテキサン 生理食塩液	160mg/m2 20mL	静注		15時			●	●																
21	ウロミテキサン 生理食塩液	160mg/m2 20mL	静注		19時			●	●																
22	ウロミテキサン 生理食塩液	160mg/m2 20mL	静注		23時		●	●	●																
23	ダウノマイシン 生理食塩液	30mg/m2 500mL	持続静注	24h						●															
24	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30min							●		●		●		●		●		●				
25	アーウィナーゼ 生理食塩水	6000IU/m2 1ml	筋注								●		●		●		●		●		●				
26	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h			●	●	●		●		●		●		●		●		●				
27	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注			●																			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン	20 mg/m2＊	分1〜3 po			●	●	●	●	●															
4	カイトリル	2mg	化学療法前内服						●	●															