レジメン名	ALL-T19 HR群 強化療法(HR3相) CNS1(オンキャスパー, 25-39歳)				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	1～2
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	2
※有の場合薬剤名	デカドロン				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●	●	●	●	●	●															
2	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg50mL	点滴静注	100m/H	9時30分	●	●																			
3	キロサイド 生理食塩液	2000mg/m2 500mL	点滴静注	3時間	10時	●	●																			
4	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg50mL	点滴静注	100m/H	21時30分	●	●																			
5	キロサイド 生理食塩液	2000mg/m2 500mL	点滴静注	3時間	22時	●	●																			
6	エトポシド 生理食塩液	100mg/m2 250mL	点滴静注	1時間	10時				●	●																
7	エトポシド 生理食塩液	100mg/m2 250mL	点滴静注	1時間	22時			●	●	●																
8	ソルコーテフ 生理食塩液	100mg 50mL	点滴静注	30min							●															
9	オンキャスパー 注射用水 生理食塩水	1500IU/m2 1バイアル5.2mlで溶解 100ml	点滴静注	1時間							●															
10	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h			●	●	●	●	●															
11	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注							●																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン	20 mg/m2＊	分1～3 po			●	●	●	●	●																
4	カイトリル	2mg	化学療法前内服			●	●																			