レジメン名	Durvalumab+GC(術前) eGFR>60				
対象がん種	尿路上皮癌	対象患者	局所進行性	催吐リスク	なし
			転移性	1コースの日数	21日
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
発熱性好中球減少症	4.5%	減量・休薬・G-CSFなど
肺炎	2.3%	ステロイド・休薬など
貧血	1.9%	減量・休薬・輸血など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				休薬完了
2	イミフィンジ 生食	1500mg 100ml	点滴静注	1時間		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
4	生食 硫酸Mg補正液1mEq/ml KCL注20mEqｷｯﾄ	1000ml 8ml 20ml	点滴静注	2時間		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
6	ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注用150mg 生食	1V 100ml	点滴静注	30分		●																				
7	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL デキサート注3.3mg/ml 生食	1V 3ml 100ml	点滴静注	30分		●																				
8	ゲムシタビン 生食	1000mg/m2 100ml	点滴静注	30分		●																				
9	シスプラチン 生食	70mg/m2 250ml	点滴静注	1.5時間	投与終了までに 1-1.5Lの経口補液	●																				
10	ラシックス注20mg 生食	1A 50ml	点滴静注	全開		●																				
11	生食	500ml	点滴静注	2時間		●																				
12	生食	50ml	点滴静注	15分									●													
13	デキサート注3.3mg/ml 生食	2ml 100ml	点滴静注	30分									●													
14	ゲムシタビン 生食	1000mg/m2 100ml	点滴静注	30分									●													
15	生食	50ml	点滴静注	15分									●													
	デカドロン	8mg（2錠）	内服				●	●																		