レジメン名	Durvalumab+GC(術前) eGFR 40-60				
対象がん種	尿路上皮癌	対象患者	局所進行性	催吐リスク	なし
			転移性	1コースの日数	21日
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)

項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
発熱性好中球減少症	4.5%	減量・休薬・G-CSFなど
肺炎	2.3%	ステロイド・休薬など
貧血	1.9%	減量・休薬・輸血など

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				休薬完了
2	イミフィンジ 生食	1500mg 100ml	点滴静注	1時間		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●							●													
4	生食 硫酸Mg補正液1mEq/ml KCL注20mEqｷｯﾄ	1000ml 8ml 20ml	点滴静注	2時間		●							●													
5	生食	50ml	点滴静注	15分		●							●													
6	ﾎｽｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄ点滴静注用150mg 生食	1V 100ml	点滴静注	30分		●							●													
7	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL デキサート注3.3mg/ml 生食	1V 3ml 100ml	点滴静注	30分		●							●													
8	ゲムシタビン 生食	1000mg/m2 100ml	点滴静注	30分		●							●													
9	シスプラチン 生食	35mg/m2 250ml	点滴静注	1.5時間	投与終了までに 1-1.5Lの経口補液	●							●													
10	ラシックス注20mg 生食	1A 50ml	点滴静注	全開		●							●													
11	生食	500ml	点滴静注	2時間		●							●													

デカドロン	8mg(2錠)	内服				●	●						●	●											