レジメン名	Sotorasib＋Panitumumab				
対象がん種	大腸がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	14
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	低マグネシウム血		Mg製剤の補充。
	皮膚障害		保湿、ミノサイクリン内服予防。
	下痢		止痢薬の投与。
その他	悪心		主にFPの減量・中止・延期、irAEも考慮
			上記Gradeに応じて減量、中止、延期す

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考（投与時刻、モニターなど）														休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●													
2	ベクティビックス 生食	6mg/kg 100ml	点滴静注	1時間		●													
3	生食	100ml	点滴静注	100ml/hr		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ルマケラス（ソトラシブ）	960mg/day	1日1回			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●