レジメン名	Trastuzumab+Pembrolizumab+FP（初回）				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	プラチンは最大6回
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	6.6%	減量・中止を行う
	血小板減少	6.6%	減量・中止を行う
	貧血	6.9%	減量・中止を行う
その他	末梢性感覚ニュー	2.6%	減量・中止を行う
	下痢	8.9%	減量・中止を行う

レジメン内容（支持療法を含む）

Arial					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	15分間	主管A	●																				
2	キイトルーダ 生食	200 mg 50 mL	点滴静注	30分間	主管A	●																				
3	生食	50ml	点滴静注	15分間	主管A	●																				
4	トラスツズマブBS 注射用水 生食	8mg/kg 0.38ml/kg 250ml	点滴静注	90分間	主管A	●																				
5	生食	50 mL	点滴静注	15分間	主管A	●																				
6	デキサート アロカリス パロノセトロン 生食	9.9mg 235mg 0.75mg 100mL	点滴静注	30分間	主管A	●																				
7	ヴィーンF 硫酸Mg補正液	500 mL 20mL	点滴静注	1時間	主管A	●																				
8	シスプラチン 生食	80 mg/m^2 500 mL	点滴静注	2時間	主管A	●																				
9	ラシックス	20mg	静注		主管A	●																				
10	デキサート 生食	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分間	主管A		●	●	●	●																
11	フルオロウラシル 生食	800 mg/m^2 500 mL	持続静注	24時間	主管A	●	●	●	●	●																
12	ヴィーンF	500 mL	点滴静注	5時間	側管A-1(5-FU同時	●																				
13	ヴィーンF	500 mL	点滴静注	5時間	側管A-1	●																				
14	生食	50 mL	点滴静注	15分間	主管A					●																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	なし																									