レジメン名	ımab+Pembrolizumab+FP(7コース目以降CD				
対象がん種	胃がん	対象患者	除不能進行・再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	6.6%	減量・中止を行う
	血小板減少	6.6%	減量・中止を行う
	貧血	6.9%	減量・中止を行う
その他	末梢性感覚ニュー	2.6%	減量・中止を行う
	下痢	8.9%	減量・中止を行う

レジメン内容（支持療法を含む）

Arial					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																				休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	15分間	主管A	●																			
2	キイトルーダ 生食	200 mg 50 mL	点滴静注	30分間	主管A	●																			
3	生食	50ml	点滴静注	15分間	主管A	●																			
4	トラスツズマブBS 注射用水 生食	6mg/kg 0.28ml/kg 250ml	点滴静注	30分間	主管A	●																			
5	生食	50 mL	点滴静注	15分間	主管A	●																			
6	デキサート 生食	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分間	主管A	●	●	●	●	●															
7	フルオロウラシル 生食	800 mg/m^2 500 mL	持続静注	24時間	主管A	●	●	●	●	●															
8	生食	50 mL	点滴静注	15分間	主管A					●															

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	なし																									