レジメン名	EC+FOLFOX				
対象がん種	大腸がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	エンコラフェニブ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)(Grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	15.1%	主にFOLFOXの減量・中止・延期、輸
	好中球減少	19.0%	主にFOLFOXの減量・中止・延期
その他	悪心	3.0%	主にFOLFOXの減量・中止・延期
	末梢神経障害	7.8%	主にオキサリプラチンの減量・中止・
	下痢	1.3%	主にFOLFOXの減量・中止・延期

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
2	デキサート ポララミン パロノセトロン 生食	9.9 mg 5 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
3	アービタックス 生食	500 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	2時間		●													
4	生食	100 mL	点滴静注	100 mL/h		●													
5	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	125 mL/h	オキサリプラチン と同時投与	●													
6	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	2時間	レボホリナート と同時投与	●													
7	フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
8	フルオロウラシル 生食	2400 mg/㎡ 全量100 mL	持続静注	46時間		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	エンコラフェニブ	300mg	内服			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	デカドロン錠	8mg/day	内服				●●	●●											