レジメン名	CDDP+PEM+ Durvalumab				
対象がん種	肺がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	高度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
				投与予定回数	4サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	17.0%	G-CSF
	貧血	33.9%	輸血
		0.0%	
その他	嘔気	25.2%	適正使用ガイドに準ずる
	皮膚障害	14.0%	適正使用ガイドに準ずる
	肺障害	3.7%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
2	イミフィンジ点滴静注用 生食	1500mg (30kg以下の場合, 20mg/kg) 100ml	点滴静注	60分		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
4	デキサート注射液 アロカリス点滴静注２３５ｍｇ パロノセトロン塩酸塩注射剤 生食	3.3mg/1ml 3瓶 235mg/10mL 1瓶 0.75mg/5ml 1瓶 100ml	点滴静注	30分		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
6	ペメトレキセド点滴静注用 生食	500mg/㎡ 100ml	点滴静注	10分		●																				
7	ヴィーンD アスパラギン酸K注射液 硫酸Mg補正液	500ml 10mEq 1キット 1mEq/1ml 8ml	点滴静注	1時間		●																				
8	20%マンニットール注射液	300ml	点滴静注	36分		●																				
9	シスプラチン注射液 生食	75mg/㎡ 250ml	点滴静注	90分		●																				
10	ヴィーンD アスパラギン酸K注射液	500ml 10mEq 1キット (10ml)	点滴静注	1時間		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン4mg錠	2錠	1日2回朝・昼食後				●●	●●																		