レジメン名	k :	キソルビシ	ンン療法	(子宮肉)	重)
対象がん種	子宮肉腫	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	高度
] '		1コースの日数	21日
] '		投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし] '		投与回数上限	DXRが500mg/m2
※有の場合薬剤名	1	1 '			に達するまで

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)											
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)								
血液毒性	貧血	71.0%	Hb8~9未満では輸血を考慮する。								
	好中球減少症	12.0%	著明な場合はGCSF製剤を考慮する。								
その他	脱毛	86.0%									
	倦怠感	84.0%									
	嘔気	64.0%	高度催吐性レジメンとしてガイドラインに従う。								

レジメン内容(支持療法を含む)

	72171 CANAMACE OF																										
					day	1	2	2	3	4	5	6	7	3 9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)																						休薬完了
	1 生食	50ml	点滴静注	100ml/h		•																					
	生食 2 パロノセトロン デキサート	100ml 0.75mg 9.9mg	点滴静注	30分		•																					
	3 生食 ドキソルビシン	100ml 75mg/m ²	点滴静注	200ml/h		•																					
	4 生食	50ml	点滴静注	100ml/h		•																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	 day	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	イメンドカプセル125mg	1錠	DXR投与1時間前		•																			
	イメンドカプセル80mg		朝食後			•	•																	
	デカドロン		朝昼分2			••	••																	