レジメン名	CBDCA+PAC+Atezolizumab				
対象がん種	胸腺がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	6サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	6サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	39.6%	G-CSF
	貧血	54.2%	輸血
		0.0%	
その他	末梢神経障害	87.5%	適正使用ガイドに準ずる
	脱毛症	83.3%	適正使用ガイドに準ずる
	便秘症	54.2%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
2	テセントリク（アテゾリズマブ）点滴静注用 生食	1200mg 250ml	点滴静注	60分（2回目以降は30分）		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
4	アロカリス点滴静注用 パロノセトロン塩酸塩注射剤 デキサート注射液 ファモチジン ポララミン 生食	235mg/10ml 1瓶 0.75mg/5ml 1瓶 3.3mg/1ml 1.5管 20mg/20ml 1管 5mg/1ml 1管 100ml	点滴静注	30分		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
6	パクリタキセル注射液 ブドウ糖液5%	200mg/㎡ 500ml	点滴静注	3時間		●																				
7	カルボプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	AUC 6 250ml	点滴静注	1時間		●																				
8	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン4mg錠	1錠	1日1回朝食後				●	●																		
2																										
3																										
4																										
5																										