

病院フォーミュラリー
Clostridioides difficile 感染症（CDI）治療（成人）

可能なかぎり現行（発症時）の抗菌薬投与終了を検討する

発症既往・難治の評価

初発例

CDI発症後8週間以内の再発

メトロニダゾール
(フラジール内服錠250mg)
1回 500mg 1日3回 10日間経口投与

メトロニダゾールに対するアレルギーや副作用により
メトロニダゾールが使用できない、
または妊婦や授乳婦の場合：

バンコマイシン
(塩酸バンコマイシン散0.5g)
1回 125mg 1日4回 10日間経口投与

バンコマイシン
(塩酸バンコマイシン散0.5g)
1回 125mg 1日4回 10日～14日間
経口投与

難治例

フィダキソマイシン
(ダフクリア錠200mg)
1回200 mg 1日2回10日間経口投与
ICD許可薬のため使用前にICDに電話が必要

■内服ができない場合、メトロニダゾール点滴静注（アネメトロ）を選択する

■難治例とは

1. CDI に対する初回治療以降、2 回以上の再発例
2. バンコマイシン内服治療にもかかわらず、治療終了時までの下痢の改善を認めない例、
もしくはショック、腸閉塞、巨大結腸症、腸穿孔を認め、CDI が原因と考えられる例

【参考】

商品名	一般名	先発/後発	剤形	総薬剤費（※）
フラジール内服錠	メトロニダゾール	先発	錠剤	¥2,172
塩酸バンコマイシン散	バンコマイシン	先発	散剤	¥9,096
ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン	先発	錠剤	¥80,256
アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール	先発	注射	¥37,680

※成人において治療1クールにかかる薬剤費の目安

2023年8月作成

本フロー問い合わせ先：感染制御室専従薬剤師