レジメン名	ALL-B19 再寛解導入療法(IIB) IR, HR				
対象がん種	急性リンパ性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	
				1コースの日数	28
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名	ロイケリン				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
																																	休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●		●	●	●	●				●	●	●	●															
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																											
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50ml	点滴静注	110mL/h		●																											
4	エンドキサン 生理食塩液	10000mg/m2 250mL	点滴静注	250mL/h		●																											
5	キロサイド 生理食塩液	75mg/m2 50mL	点滴静注	300mL/h				●	●	●	●				●	●	●	●															
6	メソトレキセート キロサイド プレドニン 注射用水	12mg 30mg 10mg 5.8mL	髄注					●							●																		
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/h		●		●	●	●	●				●	●	●	●															

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ロイケリン	60mg/m2	分1 眠前			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
2	カイトリル	2mg	化学療法30分前					●	●	●	●				●	●	●	●															
3																																	
4																																	
5																																	