レジメン名	TC+F	embro	lizumab併	用(子宮	体癌)
対象がん種	子宮体がん	対象患者	7除不能進行・再	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	6サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	10サイクル
※有の場合薬剤名		1	* 7-20サイクルでは	キイトルーダ400mgを6	- 四毎の継続投与に移行

副作用情報(發	[度が高い、特徴的な副作	作用など)	
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	25.4%	フィルグラスチム考慮、延期、減量
	血小板減少	24.3%	延期、減量、高度の場合は輸血
	貧血	46.6%	高度の場合は輸血
その他	甲状腺機能低下	12.3%	
	大腸炎	1.8%	
		0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)	

					day	1	2	3	4	. 5	- 6	3 7	8	9	10	11	12	13	3 14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Rp 薬	剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了						
1 生	食	50mL	点滴静注	30分		•																										
2 +	イトルーダ 食	200mg	点滴静注	30分		•																										
		50mL				•																										
3 生		50mL	点滴静注	30分		•																										
7	「キサート ァモチジン パララミン :食	8.25mg																														
خاہا	アモチジン	20mg	点滴静注	30分																												
[~] #	⁽ ララミン	5mg	無利利サイエ	10073		_																								,		
E	莨	100mL																														
5 生		50mL	点滴静注	30分		•																										
ر ۾	ドウ糖5% ペクリタキセル	500mL	点滴静注	3時間																												
0/	ペクリタキセル	175mg/m ²		3P+ B		•																										
7 7	ドウ糖5% ルポプラチン	250mL	点滴静注	1時間		_																										
		AUC5																														
8 生	食	50mL	点滴静注	30分		•																						í I				

内服抗がん剤・支持療法薬																															
Rp 薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 グラニセトロン内服ゼリー	2mg	治療1時間前		•																											
2 アプレピタントカプセル	125mg	治療1時間前		•																											
3 デカドロン4mg錠	8mg	朝昼1錠ずつ			••	••																									
4 アプレピタントカプセル	80mg	朝食後			•	•																									