レジメン名	ビキセオス(地固め療法)				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	35～56 days
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	2
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	71.0%	抗菌薬
	血小板減少	29.0%	輸血など
	貧血	86.4%	輸血など
その他	発熱性好中球減少症	92.0%	抗菌薬
	出血	60.0%	輸血など
	消化管障害	86.3%	対症療法

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●		●																								
2	ビキセオス 生理食塩液	65U/m^2 500mL	点滴静注	300mL/hr		●		●																								
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●		●																								

					day	29	30	31	32	33	34	35
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr								
2	ビキセオス 生理食塩液	65U/m^2 500mL	点滴静注	300mL/hr								
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr								

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カイトリル	2mg	内服			●		●																								

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35
1	カイトリル	2mg	内服									