レジメン名	Durvalumab維持療法				
対象がん種	胆道がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	40.8%	
	好中球減少	31.7%	延期、減量、G-CSF投与
	血小板減少	20.7%	延期
その他	悪心	40.8%	制吐剤投与
	便秘	32.2%	緩下剤投与
	疲労	26.9%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	30分		●																											
2	イミフィンジ 生理食塩水	1500mg 100ml	点滴静注	1時間		●																											
3	生理食塩水	50ml	点滴静注	30分		●																											

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																