レジメン名	HLH（VP-16）				
対象がん種		対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	2日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		頻度不明	
	#REF!	0.0%	
		0.0%	
その他		0.0%	
		0.0%	
		0.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)		休薬完了					
1	グラニセトロン静注液 生食20mL	40μg/kg 5mL	静注			●						
2	生理食塩液50ml エトポシド前フラッシュ用	20ml	点滴静注			●						
3	エトポシド点滴静注液100mg 生理食塩液 PVCフリールート使用 フィルター通さず	150mg/m2 500mL	点滴静注	2時間		●						
4	生理食塩液50ml エトポシド後フラッシュ用	20ml	点滴静注			●						
14												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし											