レジメン名	クラドリビン				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	初発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28 days
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少症		G-CSF、抗菌薬など
	白血球減少		輸血など
	血小板減少		輸血など
その他	感染症		抗菌薬など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●																										
2	ロイスタチン 生理食塩液	0.09mg/kg 500mL	点滴静注	24hr持続		●	●	●	●	●	●	●																				
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr									●																			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																															