

レジメン名	ルンスミオ単剤 皮下注 1サイクル目				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21 days
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数		
※有の場合薬剤名			投与回数上限		

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	G-CSF、抗菌薬など
	貧血	輸血など
	血小板減少	輸血など
その他	サイトカイン放出症候群	トシリズマブ、ステロイドなど
	ICANS	ステロイドなど

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	15分			●							●								●						
2	デキサメサゾン 生理食塩液	19.8mg 50mL	点滴静注	30分	ルンスミオ1時間前		●							●								●						
3	ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	30分	ルンスミオ30分前		●							●								●						
4	ルンスミオ皮下注	5mg	皮下注		30秒かけて		●																					
5	ルンスミオ皮下注	45mg	皮下注		30秒かけて									●								●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	アセトアミノフェン	600-900mg	内服	ルンスミオ1時間前	●							●								●							