

レジメン名	JPLSG-AML-20寛解導入療法 HCEI 3歳以上				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	5
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		
その他		

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6
1	生食50ml (プロイメンド用)	50mL	点滴静注				•					
2	プロイメンド 生食	3mg/kg (max 150mg) 50mL	点滴静注	1時間			•					
3	生食50ml (プロイメンド用)	50mL	点滴静注				•					
4	グラニセトロン 生食	0.04mg/kg 3ml	静注				•	•	•	•	•	
5	水溶性プレドニン 生食	60mg/m2 (max 60mg) 50ml	点滴静注	30分			•	•	•			
6	生食50ml (シタラビン用)	50mL	点滴静注				•	•	•			
7	シタラビン 生食	3g/m2 250ml	点滴静注	3時間	10時		•	•	•			
8	生食50ml (シタラビン用)	50mL	点滴静注				•	•	•			
9	生食50ml (イダマイシン用)	50mL	点滴静注				•					
10	イダマイシン 注射用水 生食	10mg/m2 10mL/m2 50ml	点滴静注	1時間			•					
11	生食50ml (イダマイシン用)	50mL	点滴静注				•					
12	生食50ml (エトボシド用)	50mL	点滴静注				•	•	•	•	•	
13	エトボシド 生食 (0.4mg/ml以下に溶解) (メイン止め、フィルター不可)	100mg/m2 250ml	点滴静注	2時間			•	•	•	•	•	
14	生食50ml (エトボシド用)	50mL	点滴静注				•	•	•	•	•	
15	水溶性プレドニン 生食	60mg/m2 (max 60mg) 50ml	点滴静注	30分			•	•	•			
16	グラニセトロン 生食	0.04mg/kg 3ml	静注				•	•	•			
17	生食50ml (シタラビン用)	50mL	点滴静注				•	•	•			
18	シタラビン 生食	3g/m2 250ml	点滴静注	3時間	22時		•	•	•			
19	生食50ml (シタラビン用)	50mL	点滴静注				•	•	•			
20	メトレキセート キロサイド ヒドロコルチゾンリン酸エステル 注射用水	12mg 30mg 25mg 4.8mL	髄注				•					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6
1	ステロイド点眼液		HD-Ara-C開始から最終投与24時間後まで		•	•	•	•		