レジメン名	BelaPd療法 1コース目				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名	ポマリスト/レナデックス				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	36.0%	休薬することがある
	血小板減少	55.0%	同上
その他	視覚異常	89.0%	休薬することがある
	末梢性ニューロパ	17.0%	休薬することがある
	輸中関連反応	15.0%	ほとんどがgrade1-2

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	15分		●																											
2	ブーレンレップ 注射用水 生理食塩水	2.5mg/kg 0.05mL/kg 250ml	点滴静注	30分		●																											
3	生理食塩水	50ml	点滴静注	15分		●																											

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ポマリスト	4mg/day 分1				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
2	レナデックス	40mg/day 分1				●							●							●							●						