レジメン名	(初回投与)Cmab(400)+CBDCA+5FU					
対象がん種	頭頸部がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21(～28)
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	6
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	61.0%	
	貧血	55.0%	
	血小板減少	34.0%	
その他	IR	12.0%	
	ざ瘡様皮疹	70.0%	開始時皮膚科対診。
	低Mg血症	11.0%	出現時適宜Mg補充(点滴)。

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h		●																				
2	デキサート プロイメンド ガスター ポララミン 生食	9.9 mg 150 mg 20 mg 5 mg 100 mL	点滴静注	216 mL/h		●																				
3	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●																				
4	アロキシ 生食	0.75 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●																				
5	アービタックス 生食	400 mg/m^2 500 mL	点滴静注	2時間		●																				
6	生食	100 mL	点滴静注	250 mL/h		●																				
7	カルボプラチン 5%ブドウ糖注	AUC=5 250 mL	点滴静注	1時間		●																				
8	ソリューゲンG	500 mL	点滴静注	2時間		●																				
9	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	80 mL/h			●																			
10	ソリューゲンG	500 mL	点滴静注	60 mL/h				●																		
11	ソリューゲンG	500 mL	点滴静注	40 mL/h					●																	
12	デキサート 生食	6.6 mg 100 mL	点滴静注	100 mL/h			●	●	●																	
13	フルオロウラシル 5% ブドウ糖注	1000 mg/m^2 500 mL	持続静注	24時間		●	●	●	●																	
14	ソリューゲンG	500 mL	点滴静注	80 mL/h			●																			
15	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	80 mL/h			●																			
16	ソリューゲンG	500 mL	点滴静注	80 mL/h			●																			
17	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	60 mL/h				●																		
18	ソリューゲンG	500 mL	点滴静注	60 mL/h				●																		
19	ソルデム3A	500 mL	点滴静注	40 mL/h					●																	
20	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h									●							●						
21	ポララミン デキサート 生食	5 mg 6.6 mg 100 mL	点滴静注	206 mL/h									●							●						
22	アービタックス 生食	250 mg/m^2 250 mL	点滴静注	1時間									●							●						
23	生食	100 mL	点滴静注	250 mL/h									●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									