レジメン名	エンハーツ				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	35.0%	G-ＣＳＦ
	貧血	33.0%	輸血
その他	間質性肺疾患	26.0%	適正使用ガイドに準ずる
	悪心	73.0%	適正使用ガイドに準ずる
	下痢	32.0%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
2	パロノセトロン塩酸塩注射剤 デキサート注射液 生食	0.75mg/5ml 1瓶 3.3mg/1ml 3瓶 100ml	点滴静注	30分		●																				
3	5%ブドウ糖液	50ml	点滴静注	15分		●																				
4	エンハーツ 注射用水 5%ブドウ糖液	5.4mg/kg 0.27ml/kg 100ml	点滴静注	初回90分 2回目以降30分		●																				
5	5%ブドウ糖液	50ml	点滴静注	15分		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									