レジメン名	Dose-dense EC療法				
対象がん種	乳がん	対象患者	乳癌	催吐リスク	高度
			Stage2-3	1コースの日数	14日
			70歳未満	投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし		Subtype問わない	投与回数上限	エピルビシン：900mg/m2
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	66.0%	
	貧血	67.0%	
	血小板減少	19.0%	
その他	頭痛	1%以上	鎮痛薬
	悪心、下痢、嘔吐	1%以上	整腸剤、制吐薬等
	呼吸困難	1%以上	呼吸器内科相談、減量中止を検討

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	30分		●													
2	パロノセトロン デキサート ファモチジン 生食	0.75mg 9.9mg 20mg 100ml	点滴静注	30分		●													
3	エピルビシン 生食	90mg/m2 100ml	点滴静注	500ml/h		●													
4	生食	100ml	点滴静注	500ml/h		●													
5	エンドキサン 生食	600mg/m2 250ml	点滴静注	1時間		●													
6	生食	50ml	点滴静注	30分		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4										
1	アプレピタント	125mg	内服			●													
2	アプレピタント	80mg	内服				●	●											
3	デカドロン	8mg/日	内服				●	●	●										
4	ジーラスタ	3.6mg	皮下注				●												